

造影剤検査を受けられる皆様へ

1 造影剤検査の必要性

造影剤検査とは、造影剤を血管内に注射して行う検査です。造影剤を使用すると病変の存在や性状などがわかり易くなり、正確な診断に大変役立ちます。造影剤を使用しなくても検査は可能ですが、十分な診断が出来ない場合があります。

2 造影剤の副作用

造影剤は副作用の少ないものが開発され比較的安全な薬剤ですが、他の薬剤と同様、過敏症による副作用が出現することがあります。

ヨード造影剤の副作用

- a) 軽い副作用: 吐き気・動悸・頭痛・発疹など。基本的に治療を要しません。
発生頻度は、約100人に5人程度(約5%)
- b) 重い副作用: 呼吸困難・意識障害・血圧低下など。治療を必要とします。
発生頻度は、約2.5万人に1人程度(約0.004%)
- c) 病状・体質によっては、約40万人に1人(約0.00025%)の割合で死亡例があります。
《 当院では、現在まで発生しておりません。 》

MRI造影剤の副作用

MRI造影剤は、ヨード造影剤よりも更に副作用の少ない薬です。

- a) 軽い副作用: 蕁麻疹、かゆみ、熱感、吐き気、嘔吐など。基本的に治療を要しません。
発生頻度は、約100人に2人程度(約2%)
- b) 重い副作用: 呼吸困難・意識障害・血圧低下など。治療を必要とします。
発生頻度は、約4万人に1人程度(約0.0025%)
- c) 極めて稀ですが、病状・体質によって死亡例の報告もあります。
《 当院では、現在まで発生しておりません。 》

- ◎ 遅発性という数時間から数日後に発生する副作用もあります。
その多くは、全身の発疹です。

3 緊急時の対応

- * 検査中にもし異常を感じましたら、すぐに申し出てください。至急対処します。
- * 検査後に何らかの異常が現れた場合は、各診療科へご連絡下さい。
- * 休日・時間外に発症でご心配の場合は救急外来に連絡し、行った検査名と副作用の程度をお知らせ下さい。程度に応じて、対処させていただきます。

JA 静岡厚生連 遠州病院 053-453-1111

以上の説明をご理解いただいた上で、同意書に署名をお願いします。

※ なお同意された後、いつでも撤回することができます。